

[新中国联邦](#)[中共病毒](#)

请收藏并广泛传播! Eglise推荐的抗疫解毒用药方案及营养素介绍PPT大全

[zh](#)

2022-05-06 17:28:22 | 阅读次数: 7883



喜马拉雅纽约磐石农场

736 关注者 717 文章 1.9M 总浏览量

[关注](#)[发消息](#)

摘要: 本图片库集结了Eglise医生在《避风港Haven》节目片尾的最新PPT，包括四个青蒿素衍物 - 解疫苗毒素用药指导（最新版）；用伊维菌素治疗湿疹小秘方；10%NAC上呼吸道雾化治疗液配制方法；阿司匹林的天然替代物（2021年美国营养师协会）；5种天然血液稀释剂（2021年美国营养师协会）；易吸收&少肠胃刺激产品（2021年美国营养师协会）；新冠预防口鼻咽清洁指南；Omicron疫情期间-成人预防与治疗方案；儿童新冠早期建议治疗方案2 -16岁。建议大家收藏并广泛传播，让更多人受益



本图片库集结了Eglise医生在《避风港Haven》节目片尾的最新PPT，包括四个青蒿素衍物 - 解疫苗毒素用药指导（最新版）；用伊维菌素治疗湿疹小秘方；10%NAC上呼吸道雾化治疗液配制方法；阿司匹林的天然替代物（2021年美国营养师协会）；5种天然血液稀释剂（2021年美国营养师协会）；易吸收&少肠胃刺激产品（2021年美国营养师协会）；新冠预防口鼻咽清

洁指南；Omicron疫情期间-成人预防与治疗方案；儿童新冠早期建议治疗方案2-16岁。建议大家收藏并广泛传播，让更多人受益。

新中国联邦 爆料革命推荐

解疫苗毒用药选择— 青蒿琥酯片剂(纯)



特别提醒

青蒿琥酯解疫苗毒的药物应用原理和治疗目的与抗疟疾不同，服用疗程需要延长。但因其经肝脏代谢，需要给予数日的休药期护肝。

因为接种疫苗剂数、种类，品牌等不同，个人副反应症状不同，剂量和疗程自然有异；根据病毒感染者有无并发症及其程度，服用剂量和疗程也应有异。

青蒿琥酯片剂疗程

第一疗程

成人100-150mg/天，疗程6天，之后停药一周

第二疗程

每日剂量200mg/天，疗程6天，之后停药一周
停药期间建议测血液肝功能。如检测指标都正常，开始第三疗程

第三疗程

每日剂量200mg/天，疗程7-9天

- ① 疫苗接种者可据各自情况增加调整治疗疗程；
- ② 因人而异，6-12个月后，加强排毒[如上述]1-3个疗程；
- ③ 以后每年排毒如上述n个疗程。

注意事项

- ① 在青蒿素衍生物治疗期间，请注意适当补充亚铁血红素[尤其是育龄期妇女]和足量维生素C(正常成人1500mg+/天)。
- ② 已知161种治疗药物有降低青蒿素及其衍生物代谢的作用，即能够增加青蒿素的血药浓度。在治疗慢性病或长期服药的治疗者请注意用药剂量的调整，以免造成可能的副反应。
<https://go.drugbank.com/drugs/DB13132>
- ③ 用药期间忌任何酒精饮料！



如用药后出现以下疑似肝损症状

请 - 停 - 药 - 并 - 咨 - 询 - 专 - 业 - 人 - 士

- 皮肤或眼睛呈黄色(黄疸) • 尿液颜色深 • 身体肿胀
- 恶心或呕吐 • 皮肤瘙痒 • 容易瘀伤或出血

免责声明

仅阅读此建议并不构成我们的医患关系，对任何用药后可能的风险和后果，需要您自行承担。新中国联邦将不负任何责任。

03/08 2022 · 第一版 · P02/5

新中国联邦 爆料革命推荐

解疫苗毒用药选择二 蒿甲醚(纯)



特别提醒

蒿甲醚解疫苗毒的药物应用原理和治疗目的与抗疟疾虫不同，服用疗程需要延长。但因其经肝脏代谢，需要给予数日的休药期护肝。

因为接种疫苗剂数、种类，品牌等不同，个人副反应症状不同，剂量和疗程自然有异；根据病毒感染者有无并发症及其程度，服用剂量和疗程也应有异。

纯蒿甲醚疗程

第一疗程

成人50mg/天，疗程10天，之后停药7天
或成人100mg/天，疗程7天，之后停药10天

第二疗程

成人50mg/天，疗程10天，之后停药7天
或成人100mg/天，疗程7天，之后停药10天
停药期间建议测血液肝功能。如检测指标都正常，开始第三疗程

第三疗程

成人50mg/天，疗程10天，之后停药7天
或成人100mg/天，疗程7天，之后停药10天 [剂量和疗程同前]

- ① 疫苗接种者可据各自情况增加调整治疗疗程；
- ② 因人而异，6-12个月后，加强排毒[如上述]1-3个疗程；
- ③ 以后每年排毒如上述n个疗程。

注意事项



① 在青蒿素衍生物治疗期间，请注意适当补充亚铁血红素[尤其是育龄期妇女]和足量维生素C(正常成人1500mg+/天)。

② 已知161种治疗药物有降低青蒿素及其衍生物代谢的作用，即能够增加青蒿素的血药浓度。在治疗慢性病或长期服药的治疗者请注意用药剂量的调整，以免造成可能的副反应。
<https://go.drugbank.com/drugs/DB13132>

③ 用药期间忌任何酒精饮料！

如用药后出现以下疑似肝损症状

请 - 停 - 药 - 并 - 咨 - 询 - 专 - 业 - 人 - 士

- 皮肤或眼睛呈黄色(黄疸) • 尿液颜色深 • 身体肿胀
- 恶心或呕吐 • 皮肤瘙痒 • 容易瘀伤或出血

免责声明

仅阅读此建议并不构成我们的医患关系，对任何用药后可能的风险和后果，需要您自行承担。新中国联邦将不负任何责任。

03/08 2022 · 第一版 · P03/5

新中国联邦 爆料革命推荐

解疫苗毒用药选择三 双氢青蒿素片(纯)



特别提醒

双氢青蒿素片解疫苗毒的药物应用原理和治疗目的与抗疟源虫不同，服用疗程需要延长。但因其经肝脏代谢，需要给予数日的休药期护肝。

因为接种疫苗剂数、种类，品牌等不同，个人副反应症状不同，剂量和疗程自然有异；根据病毒感染者有无并发症及其程度，服用剂量和疗程也应有异。

双氢青蒿素片疗程

第一疗程

成人40-60mg/天，疗程10天，之后停药7天
或成人80-120mg/天，疗程7天，之后停药7-10天

第二疗程

成人40-60mg/天，疗程10天，之后停药7天
或成人80-120mg/天，疗程7天，之后停药7-10天
停药期间建议测血液肝功能。如检测指标都正常,开始第三疗程

第三疗程

成人40-60mg/天，疗程10天，之后停药7天
或成人80-120mg/天，疗程7天，之后停药7-10天 [剂量和疗程同前]

- ① 疫苗接种者可据各自情况增加调整治疗疗程；
- ② 因人而异，6-12个月后，加强排毒[如上述]1-3个疗程；
- ③ 以后每年排毒如上述n个疗程。

注意事项



① 在青蒿素衍生物治疗期间，请注意适当补充亚铁血红素[尤其是育龄期妇女]和足量维生素C(正常成人1500mg+/天)。

② 已知161种治疗药物有降低青蒿素及其衍生物代谢的作用，即能够增加青蒿素的血药浓度。在治疗慢性病或长期服药的治疗者请注意用药剂量的调整，以免造成可能的副反应。
<https://go.drugbank.com/drugs/DB13132>

③ 用药期间忌任何酒精饮料！

如用药后出现以下疑似肝损症状

请 - 停 - 药 - 并 - 咨 - 询 - 专 - 业 - 人 - 士

- 皮肤或眼睛呈黄色(黄疸) • 尿液颜色深 • 身体肿胀
- 恶心或呕吐 • 皮肤瘙痒 • 容易瘀伤或出血

免责声明

仅阅读此建议并不构成我们的医患关系，对任何用药后可能的风险和后果，需要您自行承担。新中国联邦将不负任何责任。

03/08 2022 · 第一版 · P04/5

新中国联邦 爆料革命推荐



解疫苗毒用药选择四 青蒿素哌喹 或双氢青蒿素哌喹片

特别提醒

服用青蒿素哌喹或双氢青蒿素哌喹的前提条件是最近3个月未曾服用任何含喹宁类药物,包括硫酸羟氯喹预防新冠病毒。解疫苗毒的药物应用原理和治疗目的与抗疟原虫不同,服用疗程需要延长。但因其经肝脏代谢,需要在治疗期给予数日的休药期护肝。因为接种疫苗剂数、种类、品牌等不同,个人副反应症状不同,剂量和疗程自然有异;根据病毒感染者有无并发症及其程度,服用剂量和疗程也应有相应变化。

青蒿素哌喹疗程

每日青蒿素62.5mg/哌喹375mg, 4-6天一个疗程 (根据有无副反应)

双氢青蒿素哌喹疗程

每日双氢青蒿素80mg/磷酸哌喹640mg, 4天一个疗程
或每日双氢青蒿素40mg/磷酸哌喹320mg, 8天一个疗程

- ① 治疗疗程期间,如有明显毒副反应,立即停药。第一疗程结束后,休药3周,再可进行第二疗程治疗。剂量、疗程如前。如此反复3-4疗程。期间建议做血液肝功能检查,以确定青蒿素用量对肝脏无损伤;
- ② 在6-9个月后考虑加强排毒,方法如前,疗程因人而异,主要根据个人出现疫苗副反应或病毒感染后遗症的严重程度,接种疫苗剂数和个人对青蒿素的反应程度而定。加强排毒(如上述)1-3个疗程;
- ③ 以后每年排毒如上述n个疗程。

注意事项

- ① 在青蒿素衍生物治疗期间,请注意适当补充亚铁血红素[尤其是育龄期妇女]和足量维生素C(正常成人1500mg+/天)。
- ② 已知161种治疗药物有降低青蒿素及其衍生物代谢的作用,即能够增加青蒿素的血药浓度。在治疗慢性病或长期服药的治疗者请注意用药剂量的调整,以免造成可能的副反应。<https://go.drugbank.com/drugs/DB13132>
- ③ 用药期间忌任何酒精饮料!



如用药后出现以下疑似肝损症状

请 - 停 - 药 - 并 - 咨 - 询 - 专 - 业 - 人 - 士

- 皮肤或眼睛呈黄色(黄疸) • 尿液颜色深 • 身体肿胀
- 恶心或呕吐 • 皮肤瘙痒 • 容易瘀伤或出血

免责声明

仅阅读此建议并不构成我们的医患关系,对任何用药后可能的风险和后果,需要您自行承担。新中国联邦将不负任何责任。

03/08 2022 · 第一版 · P05/5

给大家推荐一个治疗湿疹的小秘方：

碾碎一片**12mg伊维菌素**，混入保湿霜
(大约0.5FL OZ,可以用很多次) 擦上十几分钟
分钟后湿疹就完全不痒了。

Eglise醫生已验证

对于带状疱疹等皮肤疾病会不会也有效呢? (大家可以试试,也许会找到最适合自己的有效良方。)



Eglise醫生

10% NAC 上呼吸道雾化治疗液配制方法

[任何年龄组均可酌情使用, 化痰, 咳镇]

NAC = 乙酰半胱氨酸

从小容量, 低浓磨粉度开始尝试:

- 1g (1000mg) NAC + 10-15 ml温蒸馏水, 搅拌混合, 有沉淀。
- 静置10-15分钟, 再搅拌。
- 取混悬液, 气雾时有刺激性酸味, 所以从低浓度开始慢慢适应. 但坚持做几天会看到效果。至少每天2次。

100ml 10% NAC 雾化液: 10g (10000mg) NAC 磨粉 + 100ml 温蒸馏水, 方法同上. 冰箱冷藏

阿司匹林的天然替代物 (2021年美国营养师协会)

White Willow Bark 柳树皮

- 白柳树皮中的
 - 1)活性水杨酸作用 – 抗COX1&2 (Cyclooxygenase-1&2)–同阿司匹林药理机理: 消炎, 解热, 镇痛
 - 2)多酚和类黄酮(polyphenols and flavonoids)-抗氧化、退热, 增强免疫力
- 被欧洲植物疗法科学合作组织 (ESCOP) 批准用于治疗轻度风湿病, 疼痛及发热症状


Arginine 精氨酸

- 一氧化氮(NO)能帮助血管壁的运动. NO的产生取决于氨基酸的L-精氨酸
- 精氨酸能帮助扩张血管, 降血压, 改善2型糖尿病, 动脉粥样硬化以及更多的功能
- 间接阻碍血栓形成

L-Arginine Supplement:
Extra Strength Nitric Oxide
Booster

L-精氨酸补充品

5种天然血液稀释剂 (2021年美国营养师协会)

<u>Turmeric 姜黄素</u>	亲戚	<u>Ginger 姜</u>	<u>Cinnamon 肉桂</u>
<ul style="list-style-type: none"> 天然的抗炎化合物，能作为抗凝剂 抗氧化力 降低患心脏病的风险 有助于预防癌症 可用于治疗阿尔茨海默病 		<ul style="list-style-type: none"> 姜含有水杨酸盐 能预防中风和心脏病 有助于减肥 有助治疗骨关节炎 可降低血糖并改善心脏病风险因素 治疗慢性消化不良，以及减轻经痛 	<ul style="list-style-type: none"> 肉桂和决明子含有香豆素，并在某些药中有强烈的抗凝剂 肉桂和决明子能降低血压并缓解由关节炎和其他炎症引起的炎症 肉桂可以提高对胰岛素的敏感性 

5种天然血液稀释剂 (2021年美国营养师协会 Cont.)

<u>Cayenne Pepper 卡宴椒</u>	<u>Vitamin E 维生素E</u>	<u>Other Foods 其它食物</u>
<ul style="list-style-type: none"> 卡宴椒水杨酸盐含量很高，因此有着血液稀释作用 卡宴椒有降血压以及增加循环的功效 	<ul style="list-style-type: none"> 维生素E:微性抗凝剂 	<p>Avocados, berries, chillies and cherries</p> <p>牛油果, 野果, 辣椒和樱桃</p> 

易吸收&少肠胃刺激的锌产品 (2021年美国营养师协会)

Thorne Research Zinc Picolinate 索恩研究吡啶甲酸锌 15毫克, 60胶囊 30毫克, 180胶囊	NutraChamps Liquid Ionic Zinc NutraChamps 液体离子锌	Garden of Life Vitamin Code Raw Zinc 生命花园之锌 30毫克, 60胶囊	Jarrow Formulas Zinc Balance 杰诺平衡锌 15毫克, 100胶囊
---	---	---	---

好处:	好处:	好处:	好处:
<ul style="list-style-type: none"> • 易吸收 • 不含最常见 的过敏原 • 不含淀粉或 填料 	<ul style="list-style-type: none"> • 含多量的维 生素C • 增强免疫及 防御 • 素食者友好 	<ul style="list-style-type: none"> • 含有60毫克的 维生素C • 含益生菌和酶 并有助消化 • 含20多种粉状 水果及蔬菜 	<ul style="list-style-type: none"> • 含有1毫克的 铜 • 不含最常见的 过敏原 • 与饭配合吃会 没有胃刺激

新冠预防 口鼻咽清洁指南 (4/1)

预防性口鼻咽清洁法

首选 Betadine, povidone-iodine (PVP) 聚维酮碘产品

- 成人版 1%PVP 浓度的 Betadine 漱口水和 1%PVP 浓度的鼻腔喷剂 (孕妇慎用)
- 儿童版 0.45%PVP 浓度的 Betadine 漱口水 (建议 9 岁及以上儿童) 和 0.45%PVP 浓度的喷鼻剂 (建议 6 岁及以上儿童)

次选 防蛀牙漱口液

- Colgate Peroxyl mouth sore rinse
- Orajel Antiseptic mouth wash
- Listerine Antiseptic mouth wash
- Scope, Act, Crest

参考文献: <https://www.bioresearchcommunications.com/index.php/brc/article/view/176>
<https://stevenyager.org/wp-content/uploads/2020/08/Steven-Yager-Dr-Brownstein-A-Novel-Approach-to-Treating-COVID-19-Using-Nutritional-and-Oxidative-Therapies.pdf>
<https://www.secondopinionnewsletter.com/Health-Alert-Archive/View-Archive/14089/This-At-Home-Treatment-Can-Knock-Out-Any-Virus-Including-the-Coronavirus.htm>

免责声明 因为医学是一门复杂而多变的科学，每个个体都是与众不同的独立存在；这个预防及治疗建议只适合大多数情况。Eglise医生不承担任何法律责任和后果。为了您的健康安全，在出现任何异常身体情况下，请您去看医生。

2022-01-10

新冠预防 口鼻咽清洁指南 (4/2)

洗鼻器鼻咽冲洗法

每天预防性冲洗2-3次口咽鼻，降低病毒载量，大幅降低被感染几率。

【用鼻腔喷雾器或者滴管，喷入或吸入鼻腔后部直到鼻咽腔，然后从嘴里吐出】

自制冲洗液

- 方法一 2茶匙10%PVP (聚维酮碘) + 6oz水 = 0.5%PVP 清洗液
- 方法二 1) 以1:10稀释35%食品级别双氧水于生理盐水 = 3-3.5% 双氧水
2) 3ml 3% 双氧水 + 250ml 生理盐水 = 0.04% 双氧水

【用来洗鼻的自制生理盐水没有无菌要求，可用9~10克食盐（海盐，至少是无碘盐）加1000毫升纯净水（凉开水也可以）全溶解即可用】

参考文献: https://www.bioresearchcommunications.com/index.php/brc/article/view/176
https://stevenyager.org/wp-content/uploads/2020/08/Steven-Yager-Dr-Brownstein-A-Novel-Approach-to-Treating-COVID-19-Using-Nutritional-and-Oxidative-Therapies.pdf
https://www.secondopinionnewsletter.com/Health-Alert-Archive/View-Archive/14089
/This-AtHome-Treatment-Can-Knock-Out-Any-Virus--Including-the-Coronavirus.htm

免责声明: 因为医学是一门复杂而多变的科学，每个个体都是与众不同的独立存在；这个预防及治疗建议只适合大多数情况。Eglise医生不承担任何法律责任和后果。为了您的健康安全，在出现任何异常身体情况下，请您去看医生。

2022-01-10

新冠预防 口鼻咽清洁指南 (4/3)

气雾疗法

适用于各年龄组，包括儿童预防及治疗，每次3ml，其余冷藏。

自制雾化治疗液

- 方法一 3ml 3% 双氧水 (食品级别) + 250ml 生理盐水 + 1ml 氯化镁液 = 0.04% 氯化镁双氧水
- 方法二 10%NAC (乙酰半胱氨酸) 雾化液: 10g NAC 药片磨成粉 + 100ml 蒸馏水 = 10% 雾化药液
【任何年龄组均可酌情使用，化痰，镇咳】
- 方法三 2003年 非典期间经验疗法
烧一盆开水，毛巾围住水盆，头伸进去，六分钟以上，热蒸汽先用嘴吸，不太热了用鼻子吸。因为病毒在鼻腔和上呼吸道有近24小时繁殖期，高温可杀死或灭活病毒。

参考文献: https://www.bioresearchcommunications.com/index.php/brc/article/view/176
https://stevenyager.org/wp-content/uploads/2020/08/Steven-Yager-Dr-Brownstein-A-Novel-Approach-to-Treating-COVID-19-Using-Nutritional-and-Oxidative-Therapies.pdf
https://www.secondopinionnewsletter.com/Health-Alert-Archive/View-Archive/14089
/This-AtHome-Treatment-Can-Knock-Out-Any-Virus--Including-the-Coronavirus.htm

免责声明: 因为医学是一门复杂而多变的科学，每个个体都是与众不同的独立存在；这个预防及治疗建议只适合大多数情况。Eglise医生不承担任何法律责任和后果。为了您的健康安全，在出现任何异常身体情况下，请您去看医生。

2022-01-10

新冠预防口鼻咽清洁指南 (4/4)

战友经验分享

Betadine产品可以只买1%PVP漱口水，用蒸馏水稀释1倍至0.5%，装入避光喷剂瓶后，即可做口腔喷剂或鼻腔喷剂使用。

免责声明
因为医学是一门复杂而多变的科学，每个个体都是与众不同的独立存在；这个预防及治疗建议只适合大多数情况。Eglise医生不承担任何法律责任和后果。为了您的健康安全，在出现任何异常身体情况下，请您去看医生。

2022-01-10

Omicron 疫情期 <成人新冠预防建议方案>

Omicron更新版 新冠预防及治疗建议方案

一、预防新冠 (均饭后服用)

伊维菌素+ [黑孜然籽油, 榆皮素和NAC (三者至少选一)]+锌+维C+维D3

▶ 伊维菌素 (Ivermectin, IVM) 和/或 黑孜然籽油 和/或 榆皮素 和/或 NAC	用量根据体重： 第一周0.2mg/公斤体重/天，口服2日 (间隔48小时以上)；以后同剂量1次/周。 40mg/公斤体重/天 1000mg/日 1000mg/日
▶ 锌 (zinc)	25-40mg/天
▶ 维生素C	1000mg/日
▶ 维生素D3	5000IU/日
▶褪黑素 (Melatonin)	5-10mg (每晚睡前)
▶ 青蒿素保健品按需服用	

免责声明
本建议方案仅限于大众普及及使用，绝不可代替个人所需的专业医疗意见。如果您寻求医疗建议，诊断和治疗，请咨询您的专业医疗人士。仅阅读此建议方案及与Eglise医生的相关交流并不构成医患关系。对因此建议方案和交流而带来的任何风险及后果，您将自行承担。Eglise医生将不负任何责任。

2022年1月11日 - 第1版 (2/1)

更新日期:2022年05月05日

Omicron 疫情期 <成人新冠治疗建议方案>

Omicron更新版 新冠预防及治疗建议方案

二、治疗新冠病毒感染 轻-中症 (均饭后服用)

伊维菌素+ [黑孜然籽油, 檬皮素和NAC (三者至少选二)]+锌+维C+维D



伊维菌素 (Ivermectin, IVM)

- 和/或黑孜然籽油: 0.4-0.6mg/公斤体重/日, 5-7天, 或急性期症状消失
- 和/或榭皮素: 80mg/公斤体重/天
- 和/或NAC: 1000-2000mg/日
- 锌 (zinc): 1200-2400mg/日
- 阿奇霉素 (Azithromycin): 75-100mg/天
- 或强力霉素 (脱氧土霉素, Doxycycline): 500mg, 1次/日, 5日
- 或阿司匹林 (Aspirin): 100mg/次, 2次/日, 5日
- 维生素D3: 325 mg/日, 2周以上
- 维生素D3: 5000-10000IU/日
- 维生素C: 1000mg/日
- PEPCID (需要时, 非处方抗胃酸药): 20mg/次, 一天1-3次
- 褪黑素 (Melatonin): 5-10mg (每晚睡前)

免责声明

本建议方案仅限于大众普及及使用, 绝不可代替个人所需的专业医疗意见。如果您寻求医疗建议, 诊断和治疗, 请咨询您的专业医疗人士。仅阅读此建议方案及与Eglise医生的相关交流并不构成医患关系。对因此建议方案和交流而带来的任何风险及后果, 您将自行承担。Eglise医生将不承担责任。

注意事项

- [1] 服用类固醇激素 (地塞米松, 强的松等) 时, 停用阿司匹林;
- [2] 土霉素 (强力霉素等)、阿奇霉素是抗生素, 得病后用;
- [3] 青蒿素 / 伊维菌素可以解疫苗毒;
- [4] 伊维菌素可以作为预防和治疗新冠感染。作为抗感染治疗, 伊维菌素必须与抗生素 (阿奇霉素或强力霉素) 同时用。

2022年1月11日 第1版 (2/2)

更新日期:2022年05月05日

儿童新冠早期建议治疗方案 2-16岁

年龄	治疗方案
2-5岁 对症治疗 退热止痛	维生素C 软糖型 250mg/天 维生素D3 软糖型 1000IU/天 褪黑素 软糖型 0.5-1mg/每晚 乙酰半胱氨酸 (NAC) 10%溶液雾化吸入, 5毫升/次, 一天四次 (10克药片溶于100毫升水成为10%药液)
6-9岁 对症治疗 退热止痛	槲皮素 500mg/天 乙酰半胱氨酸(NAC) 300mg/天 和/或黑孜然籽油 10-15mg/公斤体重/天 锌 15-25mg 维生素C 250-500mg/天 维生素D3 1000-2000IU/天 褪黑素 1mg/每晚
10-12岁 对症治疗 退热止痛	伊维菌素 0.1mg/公斤体重/天, 5天 槲皮素 500-1000mg/天 和/或乙酰半胱氨酸NAC 600mg/天 和/或黑孜然籽油 20mg/公斤体重/天 锌 25mg 阿奇霉素 250mg/天, 5天 维生素C 500mg/天 维生素D3 2000IU/天 褪黑素 1-3mg/每晚
12-16岁 对症治疗 退热止痛	伊维菌素 0.2mg/公斤体重/天, 5天 槲皮素 1000mg/天 和/或乙酰半胱氨酸(NAC) 600MG/天 和/或黑孜然籽油 20-40mg/公斤体重/天 锌 25-50mg/天 阿奇霉素 500mg/天, 5天 维生素C 500-1000mg/天 维生素D3 2000-4000IU/天 褪黑素 1-3mg/每晚

配合口服药, 自制家用10%乙酰半胱氨酸 (NAC) 10%溶液雾化吸入, 5毫升/次, 一天四次。(10克药片溶于100毫升水成为10%药液)

<https://www.webmd.com/drugs/2/drug-8938/acetlycysteine/details>

免责声明

本建议方案仅限于大众普及及使用, 绝不可代替个人所需的专业医疗意见。如果您寻求医疗建议, 诊断和治疗, 请咨询您的专业医疗人士。仅阅读此建议方案及与Eglise医生的相关交流并不构成医患关系。对因此建议方案和交流而带来的任何风险及后果, 您将自行承担。Eglise医生将不承担责任。

2022-01-17 第2版 2/2

儿童新冠预防方案 2-16岁

年龄	治疗方案
2-5岁	维生素C 软糖型 250mg/天 维生素D3 软糖型 1000IU/天 褪黑素 软糖型 0.5-1mg/每晚
5-12岁	槲皮素 500mg/天 和/或乙酰半胱氨酸(NAC) 300mg/天 锌 15-25mg 维生素C 250-500mg/天 维生素D3 1000-2000IU/天 褪黑素 1mg/每晚
12-16岁	槲皮素 500-1000mg/天 必要时, 加服伊维菌素 0.2mg/公斤体重, 2次/第1周, 当中间隔2-3天, 之后1次/周; 如无副作用, 可长期服用。 和/或乙酰半胱氨酸(NAC) 600mg/天 和/或黑孜然籽油 20-40mg/公斤体重/天 锌 25mg 维生素C 500mg/天 维生素D3 2000IU/天 褪黑素 1-2mg/每晚

免责声明

本建议方案仅限于大众普及及使用, 绝不可代替个人所需的专业医疗意见。如果您寻求医疗建议, 诊断和治疗, 请咨询您的专业医疗人士。仅阅读此建议方案及与Eglise医生的相关交流并不构成医患关系。对因此建议方案和交流而带来的任何风险及后果, 您将自行承担。Eglise医生将不承担责任。

2022-01-17 第2版 2/2

PPT设计：文成成，万物有灵，Bryan